



노빌리스 Reo + IB + G + ND

- ▶ 일회 접종으로 레오바이러스 및 감보로병에 대한 높은 항체역가 유도
- ▶ 닭 전염성 기관지염 및 뉴캐슬병 바이러스 동시 예방
- ▶ 후대병아리에 더 높은 증체율과 생산성 보장

〈조류 레오바이러스〉 Respiratory-Enteric-Orphan virus

증상

→ 흡수불량 증후군 → 면역억제로 인한 이차감염 증가 → 관절염 및 건조막염

노빌리스 Reo+IB+G+N 백신의 방어력

백신종류	공격접종주	1733주	2408주	CO8주	S113주
1733주 이용		75	100	100	100
2408주 이용		75	100	100	100
1133주 이용		83	100	100	60
CO8주 이용		11	100	100	87
1733+2408+CO8주		45	100	100	90
Nobilis Reo+IB+G+N (1733+2408주)		87	100	100	100

용량

레오바이러스감염증, 닭 전염성 기관지염, 뉴캐슬병, 감보로 바이러스

백신 접종시기 및 방법

16~18주령의 산란계 및 종계의 대토부 혹은 가슴에 근육주사 하거나 경부 피하로 접종한다.

주의 사항

- ▶ 적절한 백신접종시기와 접종방법은 사육환경에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 수의사와 상의하여 접종하십시오.
- ▶ 사용 전에 실온이 되도록 하여야 하며, 사용전에 용기를 잘 흔들어야 합니다.
- ▶ 멸균 주사기구를 사용하고, 개봉한 제품은 전체를 다 사용하여야 하며, 잔량은 폐기하여야 합니다.

포장 단위

500ml/병 (1,000수용)