

## 돼지 구제역백신 접종방법

(제공: 정현규 박사-도드람양돈농협)

1. 보관이나 이동 시 백신이 햇빛이나 추위(0℃ 이하)에 노출되지 않도록 하고, 냉장보관 (냉장고 내 최저, 최고온도계 사용)
2. 백신접종 전 실온 또는 항온수조(30℃ 내외)에 30분 정도 두었다가 10회 이상 흔든 후 거품이 없어 질 때까지 두었다가 사용 (백신온도 15~25℃)
3. 백신 보관 시 주사침을 꼽아서 두지 말 것 (백신 오염)
4. 주사침 관리원칙은 준수할 것
  - 1두 1침 원칙준수 (자돈은 1침 2두 이내 권장)
  - 철재주사침의 경우 자돈은 1침 5두 이내
  - 자돈은 단침, 모돈은 장침사용 (18~19 게이지)
  - 주사침은 손이나 장갑으로 만지지 말 것.
  - 구부러지면 즉시 교체
5. 물기가 없는 엉덩이 또는 귀 뒤 목 부위에 주사침이 직각으로 되도록 하여 주사
  - 다른 백신 접종부위를 피해서 접종
6. 자돈의 경우 목 부위 접종 시에 뼈에 닿지 않도록 주의 (주사부위 화농 등 문제)
7. 2ml, 근육 내 접종 원칙, 권장일령 준수
8. 주사부위에 주사침이나 상처로 오염되어 농 발생이 되지 않도록 최대한 주의